

ايثيرونك

شراب

نشرة معلومات للمستخدم

الاسم:
ايثيرونك

بيان التركيب:

يحتوي كل ٥ مللي شراب ايثيرونك علي:
مستخلص أوراق اللبلاب ٣٥ مجم
(معايرة تحتوي علي ما لا يقل عن ١٠٪ هيديركويزيد سي)
نسبة الإستخلاص ١:٧

إقرأ بإمعان كامل النشرة قبل تناول الدواء لأنها تحتوي علي معلومات تهلك.
قد يكون هذا الدواء متاحاً بدون روصة او وصفة طبية ولكن لاتزال تحتاج ان تتناول ايثيرونك شراب بحرص لتحصل علي افضل النتائج.

- * احتفظ بالنشرة. قد تحتاج قراءتها ثانية.
- * إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات إسأل طبيبك أو الصيدلي.
- * إذا تفاقم لديك الاعراض أو إذا لم تتحسن بعد ٧-١٤ يوماً يجب عليك أن تتصل بالطبيب.
- * إذا تفاقم أي من الآثار الجانبية، أو إذا كنت تلاحظ آثار جانبية لم تذكر في هذه النشرة، الرجاء بلّغ طبيبك أو الصيدلي.

محتوى النشرة:

- ١- ما هو ايثيرونك شراب وما هي إستعمالاته.
- ٢- قبل تناول ايثيرونك شراب.
- ٣- كيفية تناول ايثيرونك شراب.
- ٤- آثار جانبية محتملة.
- ٥- كيفية التخزين.
- ٦- معلومات إضافية.

١- ما هو ايثيرونك شراب وما هي إستعمالاته.
مستحضر عشبي يساعد علي تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن والالتهاب الحاد المصاحب للسعال والكحة.

٢- قبل تناول ايثيرونك شراب.

لا تتناول ايثيرونك شراب:
في حالة وجود حساسية ضد مستخلص أوراق اللبلاب أو أي من المكونات الأخرى.

إحذر بصورة خاصة عند تناول ايثيرونك شراب:
- المرضى الذين يعانون من التهابات أو قرح المعدة.
- السعال المتكرر أو المستمر عند الاطفال بين ٢-٤ سنوات تتطلب تشخيص طبي قبل العلاج.
- عند حدوث ضيق تنفس أو حمى أو صديد في البلغم يجب استشارة الطبيب.

- عند تناول جرعة زائدة فيكون له تأثير ملين بسبب وجود مادة السوربيتول.

- المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة من تحمل الفركتوز يجب عليهم عدم تناول الدواء.

يستخدم تحت اشراف طبي
الاستخدام للأطفال: يستخدم من سن ٦ سنوات

تناول أدوية أخرى:

لم يتم إجراء أي دراسات. حتى الآن، لم تُعرف أي تفاعلات مع الادوية الأخرى، أخير طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

- الحمل والرضاعة: لا يستخدم أثناء الحمل ولا توجد معلومات كافية عن الاستخدام أثناء الرضاعة.
- القيادة واستخدام الآلات: لا يوجد تحذيرات خاصة.

٣- كيفية تناول ايثيرونك شراب.

- العمر والجرعة:

- من سن ٦ سنوات حتي ١٢ سنة: ٥ مللي مرتين يومياً.
- الأطفال أكبر من ١٢ سنة والبالغين: ٥ مللي ٣ مرات يومياً.

- طريقة الإستعمال: شراب عن طريق الفم

يرج جيداً قبل الإستخدام

- مدة العلاج:

فترة العلاج تتوقف علي شدة الأعراض وغالباً ما تكون إسبوع، إذا مر اسبوع ولم يحدث تحسن ينبغي عليك استشارة الطبيب.

- إذا كنت تتناول جرعة أكبر من ايثيرونك شراب عما هو موصى به: لا ينبغي استخدام جرعات أكبر من الموصى بها من ايثيرونك شراب، في حالة استخدام جرعة أكبر من الموصى بها بشكل ملحوظ (أكثر من ٣ مرات الجرعة اليومية) فإنه قد يحدث غثيان، قيء أو إسهال، في هذه الحالة عليك استشارة الطبيب.

- إذا نسيت تناول ايثيرونك شراب: استشر الطبيب أو الصيدلي.

- إذا توقفت عن تناول ايثيرونك شراب: لا يوجد توجيهات خاصة إذا توقفت عن تناول ايثيرونك شراب ولكن عليك مراجعة الطبيب.

٤- آثار جانبية محتملة

قد يسبب هذا المستحضر بعض الآثار الجانبية والتي قد تحدث مع بعض الأشخاص دون الآخرين:

عند تناول بعض المستحضرات التي تحتوي علي خلاصة أوراق اللبلاب قد يحدث عند بعض الأشخاص تفاعلات حساسية مثل شعور بصعوبة التنفس، الإحمرار، التورم أو حكة بالجلد. معدل حدوث هذه الأعراض غير معروف. بعض الأشخاص ذوي المعدة الحساسة قد يحدث لديهم بعض الأعراض المعديّة مثل الغثيان أو القيء والإسهال وقد يحدث تأثير ملين أحياناً، هذه الأعراض معدّلها أيضاً غير معروف.

٥- التخزين:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

مدة الصلاحية: عامان من تاريخ الإنتاج.

ظروف التخزين: يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.

٦- مزيد من المعلومات:

- مواد السواغ: يحتوي علي مواد غير فعالة: ٧٠٪ محلول سوربيتول. صمغ الزانسان، حمض الستريك اللاماني، سوربات البوتاسيوم، نكهة الليمون السائلة، مياة مقطرة.

- العبوة: علبة كرتون تحتوي على عبوة زجاجية معتمدة سعة ١٠٠ مللي شراب مرفق بها نشرة داخلية.

الشركة المصنعة وصاحبة ترخيص التسويق:

تصنيع: المجموعة المصرية للصناعات الدوائية

لصالح: شركة ساتو فارما

العنوان: ٩ شارع اسماعيل المازني متفرع من شارع

عمار بن ياسر - النهضة - مصر الجديدة

تليفاكس: ٢٦٢٢٥٩٢٨ / ٢

البريد الإلكتروني: Satopharma.rd@gmail.com

تم مراجعة محتوى هذه النشرة في: ٢٠٢٢-٢-٣

Ivyronc

Syrup

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SMPC)

(This information is intended for use by
healthcare professionals)

1. Name of the medicinal product

Ivyronc.

2. Pharmaceutical form

Syrup.

Brown homogenous viscous liquid.

3. Qualitative and quantitative composition

Each 5 ml syrup contains

Ivy leaf extract powder (*Hedera helix* L) 35 mg

Standardization: NLT 10% Hederacoside C.

Extraction solvent: ethanol 70%

Extraction Ratio: 7:1

For the full list of excipients, see section 6.1.

4. Clinical particulars

4.1 Therapeutic indications

This herbal medicine used to alleviate the symptoms of chronic-inflammatory bronchial disorders; acute inflammations affecting the airways associated with cough.

4.2 Posology and method of administration

Route of administration

To be taken orally.

Posology

Children from 6 to 12 years of age: 5 ml twice daily (equivalent to 70 mg dried ivy leaf extract).

Children from 12 years of age and adults 5 ml three times daily (equivalent to 105 mg dried Ivy leaf extract).

Duration of use

Treatment duration depends on the type and severity of the illness; it should usually be 1 week.

If the symptoms, however, persist for longer than 1 week, medical advice should be sought.

The liquid is taken in the morning, (around mid-day) and in the evening.

Shake the bottle well before any use

4.3 Contraindications

If you are hypersensitive to the active substance or any of the other ingredients of this herbal medicine.

4.4 Special warnings and precautions for use

Keep out of reach of children.

- To be used under medical supervision.

- It has a laxative effect in overdose due to the presence of Sorbitol.

- Caution is recommended in:

- Patients with gastritis or gastric ulcer.

- Persistent or recurrent cough in children between 2-4 years of age requires medical diagnosis before treatment. When dyspnea, fever or purulent sputum occurs a doctor should be consulted.

- Patients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not to take this medicine.

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

No studies have been performed. So far, no interactions have become known. Tell your doctor or pharmacist if you are taking / using or have recently taken / used any other medicines, including over-the-counter medicines.

4.6 Fertility, pregnancy and lactation

This medicine should not be used during pregnancy and while breast-feeding since no sufficient studies are available.

4.7 Effects on ability to drive and use machines

No special precautions are necessary.

4.8.1. Undesirable effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them

Possible side effects:

After taking medicines containing ivy, allergic reactions such as trouble breathing, swelling, reddening of skin and itching may occur. The frequency is unknown. In sensitive people, gastrointestinal symptoms such as nausea, vomiting, diarrhea, as well as a laxative effect may occur. The frequency is unknown.

4.8.2. Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side-effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via the Egyptian Pharmacovigilance Center.

By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

4.9 Overdose

You should not take more Ivyronc Cough Syrup per day than stated in the dosing instructions or prescribed by the doctor. Taking significantly larger amounts (more than three times the daily dose) can cause nausea, vomiting and diarrhea. In this case, you should see a doctor.

5. Pharmacological properties

A-Pharmacodynamics property

Not required.

B-Pharmacokinetic properties

Not required.

C-Preclinical safety data

Not required.

6. Pharmaceutical particulars

6.1 List of excipients

Sorbitol Solution 70%, Xanthan gum, Citric acid anhydrous, Potassium Sorbate, Liquid Lemon flavor, Deionized water

6.2 Shelf life

2 years.

6.3 storage conditions

Store at temperature not exceeding 30° C.

Keep out of the reach and sight of children.

Do not use this medicine after the expiry date.

6.4 Nature and contents of container

Carton box containing 100 ml amber glass bottle type with insert leaflet.

6.5 Special precautions for disposal and other handling

No special requirements.

7. Marketing authorization holder & contact

Sato Pharma

Email: Satopharma.rd@gmail.com

Address: 9 Ismail Al-Muzni street, from Ammar Bin Yasser Street, Heliopolis

Tel & Fax: 02/26225928

8. Marketing authorization number

9. Date of first authorization

10. Date of revision of the text: 3-2-2022