

چواموسين

بودرة لعمل محلول يؤخذ عن طريق الضم
باراسيتامول / جوافينزين ، فينيل افرين

نشرة المعلومات الدوائية

برجاء قراءة النشرة جيدا قبل استعمال الدواء وذلك لانها تحتوي علي معلومات مهمة لك من الواجب معرفتها.
برجاء الاحتفاظ بهذه النشرة للرجوع اليها عند اللزوم.
يمكنك الرجوع للطبيب او الصيدلي للسؤال او الاستفسار بخصوص هذا الدواء.

١- ماهو هذا الدواء ولم يتم استخدامه ؟

يحتوي چواموسين علي :
باراسيتامول مسكن وخافض للحرارة.
جوافينزين طارد للبلغم ويقلل من لزوجة المخاط.
فينيل افرين مضاد للاحتقان للتقليل من التضخم في ممرات الانف للمساعدة علي التنفس بطريقة سليمة.

تستخدم اكياس چواموسين للتخفيف من اعراض البرد والم واحتقان الجيوب الانفية وعلاج الصداغ وانسداد الانف والم احتقان الزور وارتفاع درجة الحرارة.
تساعد ايضا اكياس چواموسين علي تخفيف لزوجة المخاط و تهدئة اعراض الكحة.

٢- هل هذا الدواء مناسب لك ؟

لا تستخدم هذا الدواء في الحالات الاتية:
- اذا كنت تعاني من حساسية للباراسيتامول ، جوافينزين ، فينيل افرين او اي من مكونات الدواء.
- اذا كنت تعاني من امراض القلب والاعوية الدموية.
- اذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.
- اذا كنت تعاني من ارتفاع في وظائف الغدة الدرقية.
- اذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط العين
- اذا كنت تعاني من مشاكل في التبول.
- اذا كنت تتعاطي ادوية مضادة للاكتئاب تسمي مضادات المونوماين (مثل فينيليزين ، ايزوكاربوكسازيد و ترانيسيلبريومين) او تم استخدامها منذ فترة اقل من ١٤ يوم.
- اذا كنت تتعاطي ادوية مضادة لمستقبلات البيتا.
- اذا كنت تتعاطي ادوية اخري مضادة لاحتقان مثل (ايفيدرين ، سودو افيدرين و زيلوميثازولين) او تتعاطي ادوية منشطة مثل ديكسامفستامين.
- اذا كنت تتعاطي ادوية مضادة للسعال تسمي منبطات السعال.

يرجي استشارة الطبيب او الصيدلي في الحالات الاتية:

- اذا كنتي حامل او مرضعة.
- تعاني من مشاكل بالكلي او الكبد.
- تعاني من مرض السكري.
- تعاني من مرض الفايكروموسيتوما.
- تعاني من كحة او ضيق في النفس شديدين. لابد من استشارة الطبيب اذا استمر السعال لفترة تزيد عن خمسة ايام او كنت تعاني من حمي او ارتفاع في درجة الحرارة بصورة مستمرة.
- اذا كنت تعاني من مشاكل بالدورة الدموية مثل حالة تسمي (متلازمة رينولد) والتي تتسبب في ضعف الدورة الدموية في الاصابع والاطراف.
- اذا كنت تعاني من الذبحة.
- اذا كنت تعاني من الحساسية لبعض المحليات الصناعية.
- اذا كنت تعاني من الفينيل كيتون يوريا.

يرجي استشارة الطبيب اذا كنت تتعاطي بعض من الادوية التالية:

- ادوية ارتفاع الكوليسترول والدهون في الدم مثل الكوليستيرامين.
- ادوية علاج الغثيان والقيء مثل الميتوكلوبراميد والدوميريدون.
- ادوية السيولة ومضادة التجلطات مثل الوارفارين.
- ادوية الباربيتورات لعلاج الصرع مثل دواء الفينوباربيتون.
- ادوية مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل الاعميرامين والامتريبتلين.
- ادوية علاج القلب او مشاكل الدورة الدموية او مخفضات ضغط الدم.
- الاسبرين او مسكنات الالم.
- ادوية علاج الصداغ التنصي مثل الاراجوت امين.
- زيدوفودين حيث انه من الممكن ان يتسبب في مشاكل بالدم (انخفاض في كرات الدم البيضاء).
- منبطات البيتا مثل التينولول وايضا موسعات الاوعية الدموية مثل الهيدروالازين.
- فينوتيازين كمهدىء مثل الكلورومازين والفلوفينازين.
- اذا كنت ذاهب لعمل تحاليل دم او بول حيث انه قد يؤثر علي نتيجة التحاليل.
- اذا كنت ذاهب لعمل تخدير كلي حيث انه قد يؤثر علي ضربات القلب.

هذا الدواء يحتوي علي الباراسيتامول لذا ينصح بعدم اخذ دواء اخر يحتوي علي الباراسيتامول في نفس الوقت.

قد يمكن استخدامها اثناء الحمل ، يجب عليك استخدام أقل جرعة ممكنة لتقليل الألم / أو الحمي واستخدامها لأقصر وقت ممكن.

لا تستخدم الدواء مع اي مشروبات كحولية.

لا تستخدم الدواء لفترات طويلة او المدة اكثر من خمسة ايام إلا تحت إشراف الطبيب.

لا تستخدم الدواء مع ادوية اخري لعلاج البرد.

هذا الدواء قد يسبب دوخة مما قد يؤثر علي قدرتك علي القيادة.

- هذا الدواء يحتوي علي السكروز

اذا كنت تعلم انك حساس للسكروز لابد من استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الدواء ولابد من اخذ هذا في الاعتبار لمريض السكري.

- هذا الدواء يحتوي علي الاسبرتام

قد يكون غير مناسب لمريض الفينيل كيتون يوريا.

- هذا الدواء يحتوي علي الصوديوم

يرجي الانتباه للاشخاص الذين يستخدمون حمية منخفضة الصوديوم.

٣- كيف تستخدم هذا الدواء ؟

- صب محتويات الكيس في كوب
- ضع ٢٥٠ ملي من الماء الدافئ وليس المغلي في الكوب وقم بالتقليب جيدا حتي تذوب تماما في الماء وقم بشرب الكوب.

الجرعة للكيار والاطفال اكثر من ١٢ سنة

- كيس كل اربع ساعات او حسب الاحتياج.
- لا تاحذ اكثر من اربع اكياس خلال اكثر من اربع وعشرين ساعة.
- لا ينصح باستخدامه لاطفال اقل من ١٢ عام.
- يستخدم نهائراً حيث أنه يسبب اضطرابات النوم إذا استخدم مساءً.
- برجاء الالتزام بتعليمات النشرة.

٤- الاعراض الجانبية المحتملة

- اغلب الاشخاص لا يعمرو باعراض جانبية لكن اذا شعرت بأيا من هذه الاعراض او اعراض غريبة توقف عن استعمال الدواء فوراً وراجع الطبيب او الصيدلي :
- اعراض جانبية نادرة الحدوث
اعراض حساسية قد تكون شديدة مثل طفح جلدي وتقشر الجلد وحكة وانتفاخ واحمرار اجزاء من الجلد وبعض الاوقات ضيق في التنفس وانتفاخ في الفم والشفاة واللسان والحلق او الوجه.
اضطرابات بالمعدة
تتميل بربودة في الجلد
سرعة او بطيء في ضربات القلب
ارق او صعوبة في النوم
ارتفاع في درجة الحرارة
عصبية ، ارتعاش و تشنج
ارتفاع في ضغط الدم مع وجود صداغ وقيء وعدم انتظام في ضربات القلب
- اعراض أكثر ندرة
زيادة القابلية للحرق وارتفاع الحرارة والعديوي مثل احتقان الحلق وايضا القروح.
حالات نادرة جدا من اعراض جلدية تم الإبلاغ عنها.
اذا شعرت باي اعراض جانبية مختلفة عن السابق ذكرها، تكلم مع الصيدلي او الطبيب

٥- كيف يمكن تخزين هذا الدواء ؟

- احفظ بهذا الدواء بعيدا عن متناول الاطفال.
- لا تستخدم هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون علي العبوة.
- يحفظ في درجة حرارة اقل من ٣٠ مئوية في مكان جاف.
- مدة الصلاحية: عامان.

٦- ماذا يوجد بداخل العلبة ؟

كل كيس ٥ جرام يحتوي علي مسحوق مائل للبياض يحتوي علي الاتي:
باراسيتامول ١٠٠٠ مجم
جوافينزين ٢٠٠ جم
فينيل افرين ١٢,٢ جم
المواد الغير فعالة : سكروز، سترات صوديوم لامائي، ستريك اسيد لامائي، اسبارتام ، سكارين صوديوم ، نكهة الليمون ولون كينولين اصفر.
العلبة تحتوي علي ١٠ اكياس سعة كل كيس ٥ جرام بودرة ومرفق نشرة داخلية

٧- الشركة المصنعة للدواء ؟

تصنيع دي بي كي للصناعات الدوائية (دي بي كي فارما) لصالح شركة باراميديكو للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

تصنيع: دي بي كي للصناعات الدوائية (دي بي كي فارما)

لصالح: شركة باراميديكو للصناعات الدوائية

والمستلزمات الطبية.